三變所餘不四則八故掛扐之數五四爲奇九八爲耦凡四爲奇凡八爲耦正解曰揲蓍之法以四數之故單四爲奇八則倍於四矣故爲耦朱子曰五四爲少者一揲之數也八九爲多者兩揲之數也一揲爲奇兩揲爲耦奇圓圍三耦方圍四正解曰三箇三各爲一而難合故曰奇上與下合爲二左與右合爲二故曰耦三用其全四用其半正解曰凡四爲奇奇卽三也三用其全三還是三也凡八爲耦耦卽二也四用其半四減爲一也積而數之則爲六七八九正解曰此以掛扐之數言而第三變揲數策數亦皆符會正解曰此以掛扐之外過揲者言其曰三變者通三變而言也第三變通前二變觀之而其揲之數過揲之策數亦皆符會者如得九則揲數九箇四策數四箇九皆合乎九數也六與七八皆然蓋餘三奇則九而其揲亦

九策亦四九三十六是爲居一之太陽正解曰三奇則九者所歸餘之數本三箇四每四當一奇奇圓圍三而用其全則爲三箇三故曰三奇則九每一次奇作三算也其揲亦九謂三奇外之策以四揲之凡九箇四也策亦四九三十六者謂更將此策以九數之又爲四箇九也少陰少陽倣此餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰正解曰三耦則六者所歸餘之數本三箇八每八當一耦耦方圍四而用其半則爲三箇二故曰三耦則六每一次耦作二算也其揲亦六謂三耦外之策以四揲之凡六箇